

ОТЗЫВ

на автореферат Бабешкина Романа Николаевича на тему «Оптимизация лекарственного лечения больных трижды негативным раком молочной железы», представляемой к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология.

Научная работа Р.Н Бабешкина посвящена актуальной проблеме клинической онкологии – улучшению результатов лечения больных трижды негативным раком молочной железы.

Неблагоприятное течение трижды негативного рака молочной железы подчеркивает необходимость разработки эффективных методов системной терапии. В связи с отсутствием экспрессии ER, PR и HER2/neu (и в силу этого неэффективностью адресной гормонотерапии и анти-HER2-терапии) основным методом лечения таких больных является химиотерапия. В настоящее время не существует особых режимов, рекомендуемых для этой категории больных. Многочисленные исследования посвященные данной проблеме показывают самые низкие показатели общей и безрецидивной выживаемости в подгруппах трижды негативного рака молочной железы по сравнению с другими подтипами. Данное исследование интересно тем, что в нем подробно рассматривается вопрос выбора оптимальной схемы лекарственного лечения больных трижды негативным раком молочной железы. С этих позиций, диссертационное исследование Бабешкина Р.Н. целью которого было улучшение результатов лечения больных с трижды негативным раком молочной железы, несомненно, является своевременным и актуальным.

В работе доказана недопустимость применения химиотерапевтической схемы CMF, а также выполнение только одного хирургического лечения для пациенток, имеющих трижды негативный рак молочной железы. На основании результатов проведенного исследования разработан и внедрен в клиническую практику новый подход к химиотерапевтическому лечению больных трижды негативным раком молочной железы. Предлагаемый комплексный подход позволил увеличить продолжительность жизни и время до прогрессирования у пациенток, получавших лекарственное лечение препаратами таксанового ряда.

Практическая значимость данной работы несомненна в виду появления возможности внедрить новый, более оптимизированный подход к лекарственному лечению пациенток с трижды негативным раком молочной железы с учётом клинических и морфологических особенностей опухолей, тем самым повысив эффективность комплексного лечения.

